

interim in pulmonum, cordis, iecoris, uentriculi, lienis & renum affectibus, uenam in cubito
nō Hippocrates solum, sed omnis medicorum chorus fecer. Caterum quoniam Epistola-
per commemorata, hæc prolixius cum aliquot alijs paradoxis persequitur, cauæ uenæ distri-
butionem deinceps non interrupta sermonis serie aggredit. ne mihi præter ueræ hominis
historiæ narrationem in hoc negocium augeam, ut ubi à Galeno diffidentium etiam ascribam,
ipsius sententiam uerbis aliquot refellam: & ne propter meam in eum pietatem, etiam proli-
xè mihi uenia petenda sit, quo rabularum animos leniam, quos miras excitatos noui trage-
dias, si semel atque iterum Galenum purgare, & friuolis quibusdam ratiunculis ab errore uin-
dicare poterunt, parum solliciti, quòd tot innumeris locis ipsius placita à ueritate dissona cerò
(quantumuis interim inuitus) ostendam. Hactenus enim non semel expertus sum, quàm eius-
modi homines apud dissectionum imperitos gloriari soleant, quum rationem aliquam expo-
gitaissent, quæ Galenus excusari, aut ut ipsi loquuntur, cum ostensa à me parte concordari pos-
sit. Quàm turpiter uerò se tum postea in publicis sectionibus dederint, quum suos Achilles
mihi proponerent, ipsi probentur. Vena igitur cauæ, postquam sine pari uenam à se didu-
xit, ad iugulum recta sub pectoris ossè¹ descendit, membranis thoracem interficientibus ele-
ganter sustulsa, molleq; & glandosum corpus hîc in iugulo passim adstratum obtinēs, quod
Græci θυμὸν, Latini uerò communi glandularum nomine glandum uocant. Est autem glandi-
um id in elastissima thoracis sede extructum, ut ab omni noxa frequentissimas uasorum dis-
tributiones hîc suspensas, immunes seruaret. Vena enim cauæ² inibi primum in duos insi-
gnes truncos discinditur, à quibus omnes uenæ cauæ partis ad elatiora corporis porrectæ so-
boles pendent. A sinistro namq; trunco, quemadmodum & à dextro,° grandis uena promi-
tur, quæ primæ thoracis costæ innixa postquam aliquot à se dispersit ramos, sub clauicula in
axillam³ properat. Ab huius etenim radice⁴ exilis uena nascitur, deorsum per costarum radi-
ces ad tertiam usque costam exporrecta, & exiguas soboles tribus superioribus costarum inter-
uallis, aliquando duntaxat duobus, deriuans. Præsens uena non semper ab eius quæ axillam
petit radice pronascitur, uerum nonnunquam à cauæ priusquam in duos illos grandes truncos
bipartiaris, principium ducit. Quinetiam interdum hanc penitus abesse obseruaturus es, aut
araneæ filorum modo prætenuem, quum breuiora illarum costarum interualla ab ipsis in-
bente uena quæ axillam petit, aliquando autem à uenæ pari carentis propaginibus (idq; post-
sumum in dextro latere) satis nutrimenti assumant. Ab anteriori sede illius magna in iugulo
bipartitionis, duæ prodeunt uenæ, quæ introsum ductæ, ad elatiorem pectoris ossis sedem
contendunt, & sub pectoris ossè deorsum perrepantes numerosas à se diffundunt soboles.
Sinistra (quod & de dextra subauditum uelim) secundum læuam pectoris ossis latem, ubi co-
stifarum cartilagines ipsi coarctantur, decliuas ad abdominis superiora tendit, in progressu ad
sex superiorum septem costarum interualla singulas propagines distribuens, quæ ad termi-
num ossis costarum ubi uenæ coniuge carentis ramos cessare diximus, finiunt. Quemadmo-
dum uerò à ramis uenæ pari carentis, propagines extra thoracis amplitudinem ad musculos
costis instratos excidere relatum est, sic quoque à uenis ad cartilaginum interualla dissemina-
tis, ramuli notati digni in musculos pectori incumbentes, ipsasq; ad eò mamillas propagitur,
si modò ad has à uenis pectoris ossi exporrectis, furculi deriuentur. Porro quod ex uenis sub
pectoris ossè deductis⁵ reliquum adhuc est, ad latus mucronatæ cartilaginis deorsum in car-
nosam rectorum abdominis musculorum partem distribuitur. Venæ enim è thoracis ampli-
tudine prolapsæ, sub rectis musculis ad mediam usq; abdominis sedē feruntur, ramosos quoq;
dum in proximas partes utrinque transmittentes. Quorum præcipuus ad abdominis cutem
subit, atque oblique secundum costarum cartilaginum terminos propagatus, in gracillimas et
capillorum modo subiles uenulas exhauritur. Ceterum insigniores uenarum rami, sub rectis
musculis exporrecti, in plures furculos⁶ supra umbilici sedem cessant, qui rectorum abdomi-
nis musculorum substantiæ implexi, illarum uenarum terminos finesq; spectant, quas in ser-
monis progressu, ab imo propter genitalia sursum sub rectis musculis cōscendere audies, quū
earum usus quem in menstrui sanguinis ad lactis generationem, & sanguinis item ex mamilla-
rum sedibus ad uterum fetus enutriendi gratia reuulsiōnem, ipsas præbere credimus, expli-
cabitur. Harum uenarum sub pectoris ossè reptantium originem ex anteriori mediæq; in iugu-
lo bifurcationis sede, ut plurimum fieri animaduertes. interdum uerò eas ab⁷ axillarium uena-
rū radicibus, postquam illæ nō nihil à iuguli medio in latera recesserāt, enatas obseruauit: quæ
admodum aliquando alteram ipsarum, & præsertim sinistram ab axillari, alteram uerò ab ipsa
bifurcatione pronatā uidit: quemadmodum etiam nō infrequenter occurrit ab anteriori uenæ
cauæ sede, ubi in duos insignes truncos partitur, unicam pronasci, quæ sursum ad pectoris os
ducta,

Quam ob rem
non semper ser
moni addendū,
ubi is à Gale
ni placitis de
clinat.
Cauti ad iugu
lum incessus.

*Caudæ caudæ,
cisin iugulo
bipartitio.*

Vena axillá-
rem constitu-
entis ortus.
Vena superio-
ra costarum
interualla pe-
rens.

Vena sub pe-
ctoris offe de-
orsum repen-
tes.

ducta, in duas diffcinditur uenas, ac unam dextro pectoris ossis lateri,
 exporrigit. Ab his quoque uenis secundum pectoris os deducendis, ma-
 cis cauitatem interdiuidentes primos mutantur furculos, ac subinde e-
 nunc dictas promitt uenas, ^a graciles quasdam propagines sibi uendican-
 tam membranarum longitudinem cum ^a neruis septi transuersi exporrecas.
 antea monui, ^a uena pari carente in membranas thoracis cauitatem intersep-
 cedunt, uenis quæ ^a adhærentem oculi tunicam implicant, quàm similimi. A
 fofoles in cordis inuolucrum, ubi membranz thoracem intersepientes ^a hoc ce-
 gunt. Cæterum ^a uena axillam accedens priusquam è thorace procidit, non
 ipfius initio ex elatiori fede ^a uenam utcunque amplam promit, quæ f-
 posteriora tendens, ad transuerfos uertebrarum ceruicis processus dedu-
 ramina illis priuatim exculptra fursum confcendens in mufculos uertebris p-
 fofoles fpargit. Atpræter illas, certo ordine & ueluti geniculatim singulas
 quæ foraminì neruorum exoritur in ceruicis uertebris incifo deriuat, dor-
 ipfis quæ adeo uertebris alimentum fuppeditat. Quod uerò eius uenæ reliqu-
 riam contendit, peculiare fibi cum ^a fua coniuge arteria foramen obtinens.
 rior em occipitis ossis capituli sedem excavatum antea dixi. Vbi uerò uen-
 plitudinem pertingit, in ^a fecundum fcu finiftrum duræ cerebri membran-
 ftea auditurus es diffufus, exhauritur. Præter hanc uenam, ^a alia adhuc ab-
 lam contendit, priusquam è thoracis cauitate labitur, ex ipfius posteriori reg-
 ducit, quæ in mufculos, humilioribus ceruicis & thoracis elatioribus uertebr-
 pitis dorfisq; & thoracis motibus famulantes, difpenfat. Simulatq; uerò axil-
 linter primam thoracis costam & clauiculam ex thoracis cauitate progreditur
 perforat qui fecundi paris dorfum mouentium alter est, non femel ^a cam ^a pro-
 humeralem poftea uocabimus, & ilico atq; decliuus ducta glandulas in axilla-
 rum distributionem à Natura procreatas contingit, quas nunc dicam à fce m-
 Primum utrinque singulas promit uenas, & ad thoracis quidem anteriora
 fteriora autem ^a alteram. Quæ antrorfum exporrigitur, in ^a mufculos à pect-
 ad brachij os & fcapulam pertingentes diffunditur, & pectoris cutem simul
 quenti admodum ramorum ferie in mulieribus adit. Vena autem retrorfum
 fculos cauam fcapulæ sedem occupantes, uicinasq; fedes multipliciteriæ fob-
 rerum nonnunquam à ^a priori & quæ pectus accedit uena, interdum uerò ab-
 confitit ^a trunco ^a alia grandis utcunq; uena exoritur, quæ deorfum fecundū
 exporrecta, potiffimum abfumitur in ^a mufculum, cuius beneficio brachiū d-
 mouemus. Præter hos maiores maior uena quæ in axilla habetur, ^a exiguis ab-
 dulis & mēbris, quæ inibi uaforum distributionibus eorundeq; colligatæ
 Quæ autem ferie axillaris uenæ reliquum in totam manum excurrat, peculiari
 quæ cæteras afcendens uenæ cauz propaginis fofoles abfolum, expediam
 gulum rursus fermone conuerfo, cæteros truncorum ^a magnæ illius in iugu-
 mos aggrediamur. Vena itaq; caua ad eum quem dixi modum priusquam pe-
 mum tranfcendat, in duos truncos diducitur, ac ftatim à diuifione nuper ^a ce-
 na, quæ axillam pectit, principium obtinet: quod autem alterius diuifionis illi
 fupereft, à media primæ thoracis uertebræ corpore fede, cui prius innitebat
 dens, fursum extra thoracem protenditur, & fimulatq; clauiculam pectoris
 fuperauit, in ^a duos impares ramos fcinditur. Interior namque exteriori magis
 bitrantur gracilior eft, & fecundum afperæ arteriæ latus ^a afcendens, nonn-
 fpeciem capillorum exiles afperæ arteriæ contininisq; membranis commu-
 rior fcendit iugularis, quæ cum fui lateris ^a foporalis arteria uerfus cerebrum f-
 fu graciles ramulos membranulis ^a fexti neruorum cerebri paris in collo & in f-
 ptimi paris neruof colligantibus digerit, uniuerso ductu foporalis arteriæ a-
 bafim commiffa. quò cum ^a peruenit, in duos inæquales amplitudine ramo-
 rum ^a amplior oblique retrorfum, fecundum caluariæ bafim ductus, caluariam
 dam foporalis arteriæ ramo ingreditur, ^a foramine uicis fexti neruorum ce-
 riam exculpit. Quæ uerò ferie in caluariæ cauitate præfens ramus digeratur
 rum defcriptione affatim perfequar: modò autem laterit, ad caluariæ ufque ar-
 nas, quæ cōpertingunt, fermone deducere. Ab ampliori hoc iugularis interi-
 uti diximus in pofteriora fecundum caluariæ bafim in contendit, ^a prop-